



سرشناسه

عنوان و نام پدیدآور

مشخصات نشر

مشخصات ظاهری

شابک

وضعیت فهرست نویسی

یادداشت

موضوع

شناس افزوده

رده بندی کنگره

رده بندی دیوبی

شماره کتابشناسی ملی

اطلاعات رکورد کتابشناسی

محمدپور، حسن، ۱۳۶۸- مسلمی، سام

Sabiston Textbook of Surgery/2022 / A

ترجمه و تلخیص: حسن محمدپور - سام مسلمی

تهران: کاردیا، ۱۴۰۲.

۲۶۰ ص.

۹۷۸-۶۲۲-۸۲۴۳-۳۲-۰ شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۸۲۴۳-۳۱-۳ دوره: ۰۰۰/۳۰۰ ریال

فیبا

کتاب حاضر ترجمه و تلخیص از کتاب **Sabiston Textbook of Surgery/2022** است.

اصول جراحی سابیستون

جراحی عمومی Surgery

جراحی آزمونها و تمرینها Surgery—Examinations, questions, etc

Townsend, Courtney M. ام. کورتنی

Andersen, Dana K کی دینا

۲۵۴RJ

۹۲/۶۱۸

۹۲۵۷۰۵۸

فیبا

چاپ و لیتوگرافی: **رزیدنت یار**

نوبت چاپ: اولف ۱۴۰۲

ترجمه و تلخیص: دکتر حسن محمدپور - دکتر سام مسلمی

فصلوں منتخب سابیستون A

Sabiston Textbook of Surgery/2022

ناشر: انتشارات کاردیا

شابک: ۰۰۰-۹۷۸-۶۲۲-۸۲۴۳-۳۲

صفحه آر: **رزیدنت یار- منیرالسادات حسینی**

شابک دوره: ۳-۰۰۰-۹۷۸-۶۲۲-۸۲۴۳-۳۲

طرح و گرافیست: **رزیدنت یار- مهراد فیضی**

بهای: ۶۳۰۰۰ تومان

آدرس: تهران میدان انقلاب - کارگرجنوبی - خیابان روانمهر - بن بست دولتشاهی پلاک ۱ واحد ۱۸

شماره تماس: ۰۰۰-۰۲۱-۸۸۹۴۵۲۱۶ ، ۰۲۱-۸۸۹۴۵۲۰۸ / ۰۲۱-۸۸۹۴۵۲۰۸

www.residenttyar.com

هر گونه کپی برداری از این اثر پیگرد قانونی دارد.

فصل منتخب ساپیستون

A

Sabiston Textbook of Surgery/2022

ترجمه و تالیف

دکتر حسن محمدپور

رتبه برتر آزمون بورد ۱۴۰۲

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جراحی عمومی

دکتر سام مسلمی

فلوشیپ جراحی غدد درون ریز

دانشگاه علوم پزشکی تهران



فصل ۱۰ - اصول آماده‌سازی قبل از عمل	۱۳
سوالات و پاسخنامه فصل ۱۰	۴۱
فصل ۱۸ - جدار شکم	۵۵
سوالات و پاسخنامه فصل ۱۸	۶۷
فصل ۲۰ - سوختگی	۷۳
سوالات و پاسخنامه فصل ۲۰	۱۰۷
فصل ۲۱ - گزش و گازگرفتگی	۱۲۵
سوالات و پاسخنامه فصل ۲۱	۱۳۳
فصل ۲۲ - مراقبتهای بحرانی	۱۴۹
فصل ۲۳ - پروسیجرهای جراحی در ICU	۱۶۳
فصل ۲۴ - نقش جراحان در بلایای بزرگ	۱۷۳
فصل ۴۶ - شکم حاد	۱۸۳
سوالات و پاسخنامه فصل ۴۶	۲۰۱
فصل ۶۴ - ترومای عروقی	۲۰۵
سوالات و پاسخنامه فصل ۶۴	۲۲۷
فصل ۷۲ - جراحی در بارداری	۲۳۳
سوالات و پاسخنامه فصل ۷۲	۲۵۳

اصول آماده‌سازی قبل از عمل

فصل ۱۰

Sabiston: Section 10

- ✓ ۳ هدف مهم در جراحی برای پهلوود نتایج جراحی و کسب رضایت بیمار عبارتند از:
Disease presentation, disease control, Symptom palliation
- ✓ دوره پری اپراتیو ← حین عمل تا ۴۸ ساعت بعد از عمل
- ✓ دوره Post-OP ← تا ۳۰ روز بعد از عمل
- ✓ در عمل جراحی Urgent، از زمان تشخیص تا عمل، ۴۸ ساعت فرصت داریم.

محاسبه‌گر خطر عمل جراحی

BOX 10.1 ACS NSQIP universal Surgical Risk Calculator reported outcome measures.

- Serious complication (cardiac arrest, myocardial infarction, pneumonia, etc.)
- Any complication (surgical site infections [SSIs], pulmonary embolus, ventilator >48 hours, etc.)
- Pneumonia
- Cardiac complication
- SSI
- Urinary tract infection
- Venous thromboembolism
- Renal failure
- Readmission
- Return to the operating room
- Death
- Discharge to nursing or rehabilitation facility
- Sepsis

ACS, American College of Surgeons; NSQIP, National Surgical Quality Improvement Program.



برای همه بیماران ارزیابی خطر توسط سیستم ASA انجام می‌شود شامل:

(ASA 1-2) ← بیمار Low risk ✓

(ASA 3) ← بیمار Intermediate risk ✓

(ASA 4-5) ← بیمار High risk ✓

TABLE 10.1 American Society of Anesthesiologists physical status (ASA PS) classification.

ASA PS	DEFINITION
I	A normal healthy patient
II	A patient with mild systemic disease
III	A patient with severe systemic disease
IV	A patient with severe systemic disease that is a constant threat to life
V	A moribund patient who is not expected to survive without the operation

Adapted from Cohn SL. Preoperative evaluation for noncardiac surgery. *Ann Intern Med.* 2016;165:ITC81–ITC96.

پیش‌بینی کننده‌های خطر حوادث قلبی تا ۳۰ روز بعد از عمل:




FIG. 10.1 The observed mortality rate as a function of American Society of Anesthesiologists (ASA) physical status and surgery-specific risk. (Adapted from Glance LG, Lustik SJ, Hannan EL, et al. The surgical mortality probability model: derivation and validation of a simple risk prediction rule for noncardiac surgery. *Ann Surg.* 2012;255:696–702.)



TABLE 10.2 Surgical risk estimates depending on the type of operation.

LOW RISK: <1%	INTERMEDIATE RISK: 1%-5%	HIGH RISK: >5%
<ul style="list-style-type: none"> • Superficial surgery • Breast • Dental • Endocrine: thyroid • Eye • Reconstructive • Carotid asymptomatic (CEA or CAS) • Gynecology: minor • Orthopedic: minor (meniscectomy) • Urological: minor (transurethral resection of the prostate) 	<ul style="list-style-type: none"> • Intraperitoneal: splenectomy, hiatal hernia repair, cholecystectomy • Carotid symptomatic (CEA or CAS) • Peripheral arterial angioplasty • Endovascular aneurysm repair • Head and neck surgery • Neurologic or orthopedic: major (hip and spine surgery) • Urologic or gynecologic: major • Renal transplant • Intrathoracic: nonmajor 	<ul style="list-style-type: none"> • Aortic and major vascular surgery • Open lower limb revascularization or amputation or thromboembolectomy • Duodenopancreatic surgery • Liver resection, bile duct surgery • Esophagectomy • Repair of perforated bowel • Adrenal resection • Total cystectomy • Pneumonectomy • Pulmonary or liver transplant

CAS, Carotid artery stenting; CEA, carotid endarterectomy. From Kristensen SD, Knuuti J, Saraste A, et al. 2014 ESC/ESA guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management: The Joint Task Force on Non-Cardiac Surgery: cardiovascular assessment and management of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Anaesthesiology (ESA). *Eur J Anaesthesiol*. 2014;31:517–573.

ارزیابی بیماران مسن:

BOX 10.2 ACS NSQIP/AGS collaborative checklist for preoperative assessment of geriatric surgical patients.

In addition to conducting a complete history and physical examination of the patient, the following assessments are strongly recommended:

- Assess the patient's **cognitive ability** and **capacity** to understand the anticipated surgery.
- Screen the patient for **depression**.
- Identify the patient's risk factors for developing postoperative **delirium**.
- Screen for alcohol and other substance abuse/dependence.
- Perform a preoperative **cardiac** evaluation according to the American College of Cardiology/American Heart Association algorithm for patients undergoing noncardiac surgery.
- Identify the patient's risk factors for postoperative **pulmonary** complications and implement appropriate strategies for prevention.
- Document **functional status** and history of **falls**.
- Determine baseline **frailty** score.
- Assess patient's **nutritional status**, and consider preoperative interventions if the patient is at severe nutritional risk.
- Take an accurate and detailed **medication history**, and consider appropriate perioperative adjustments. Monitor for **polypharmacy**.
- Determine the patient's **treatment goals** and **expectations** in the context of the possible treatment outcomes.
- Determine patient's family and social support system.
- Order appropriate preoperative **diagnostic tests** focused on elderly patients.

ACS, American College of Surgeons; AGS, America Geriatrics Society; NSQIP, National Surgical Quality Improvement Program. From Chow WB, Rosenthal RA, Merkow RP, et al. Optimal preoperative assessment of the geriatric surgical patient: a best practices guideline from the American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program and the American Geriatrics Society. *J Am Coll Surg*. 2012;215:453–466.

جدار شکم

فصل ۱۸

Sabiston: Section 18

علی‌رغم اینکه لاپاراتومی میدلاین شایع‌ترین برش در بسیاری از جراحی‌های شکمی است، شواهد کمی برای راهنمایی جراحان در بستن جدار شکم به بهترین نحو در دست است.

جنس سوچور:

نخ بخیه ایده‌آل برای بستن جدار شکم باید:

- ۱- در برابر عفونت مقاوم باشد.
- ۲- قدرت کشسانی کافی داشته باشد.
- ۳- آسیب بافتی را به حداقل برساند.
- ۴- قابل جذب باشد.

نخ‌های آهسته جذب منوفیلامان مثل پلی دیوکسانون (PDS; Ethicon, Johnson & Johnson) در مقایسه با نخ پلی گلاکتین برای بستن جدار شکم به دلیل: ۱- قدرت کششی بالاتر ۲- زمان جذب بالاتر و در عین حال تک رشتۀ‌ای بودن آن باعث می‌شود در مقایسه با نخ بافته شده، نسبت به عفونت مقاوم بر باشد.

استفاده از نخ غیر قابل جذب برای بستن جدار شکم (مثل پلی پروپیلن) با درد و تشکیل سینوس تراکت بیشتری همراه بوده و تفاوت بارزی در میزان بروز هرنی انسزیونال، باز شدن زخم و عفونت محل عمل نداشته است.

تکنیک بستن:

- به حداقل رساندن آسیب بافتی امری ضروری است و این با محدود کردن درگیر شدن عضلات جدار شکم در بستن آن محقق می‌شود.



- نسبت ۴ به ۱ نخ سوچور به طول زخم ارجح است، اگرچه شواهد جدید استفاده از فواصل کمتر (5 mm/5mm) را پیشنهاد می‌دهند. چون بخیه‌های کوچکتر با کاهش آسیب و ایسکمی بافتی همراه است و بروز باز شدن و فتق جدار شکم را کاهش می‌دهد.
- بستن یکپارچه جدار شکم نسبت به بستن لایه به لایه ترجیح داده می‌شود (منظور از لایه به لایه یعنی بستن پریتوئن و زیرجلد علاوه بر فاشیا و پوست).
- روش توصیه شده بستن جدار شکم در جراحی‌های الکتیو، بخیه ممتد با نخ آهسته جذب است.
- شواهد کمی در مفید بودن آن‌ها در دست است: Retention suture
- Retention suture با درد بیشتر، التهاب زخم بیشتر، آسیب پوست و مشکلات در تعییه وسایل استوما همراه است.
- بیماران در معرض خطر بالای باز شدن حاد فاشیا ممکن است از نوعی روش پروفیلاکسی برای بیرون زدن احشاء سود ببرند و برخی استفاده از مش صناعی را در بستن جدار شکم پرخطر پیشنهاد کرده‌اند.

دھیسنس (Dehiscence) فاشیای شکم:

- میزان بروز باز شدن فاشیا بعد از جراحی‌های مژور شکمی تا ۳/۵ درصد گزارش شده است و موجب مورتالیتی و موربیدیتی جدی می‌شود.
- وقوع باز شدن حاد فاشیا ممکن است با افزایش ترشحات خونابهای از زخم لایه اوتومی از پیش هشدار داده شود و می‌توان با معاینه فیزیکی آن را تأیید کرد.



FIG. 18.1 Fascial dehiscence.

- علل تکنیکال باز شدن حاد فاشیا عبارتند از: ۱- نقص گره (نادر) ۲- آسیب فاشیا (معمولًاً مرتبط است به کشش، ایسکمی) ۳- و آسیب نخ بخیه.
- با اینکه تا بعد از ۳ هفته از عمل جراحی احتمال باز شدن فاشیا وجود دارد ولی زمان معمول در طی ۷ روز اول پس از بستن اولیه رخ می‌دهد.
- بسته به میزان پروسه‌ی التهابی داخل شکم، ممکن است شکم برای لپاراتومی مجدد غیر قابل دسترس باشد و باز شدن فاشیای شکم مانند یک هرنی جداری انسزیونال برنامه‌ریزی شده با ترمیم تأخیری مدیریت شود.

سوختگی

فصل ۲۰

Sabiston: Section 20

عواملی که باعث بهبود چشمگیر نتایج بالینی بیماران با سوختگی شده است:
پیشرفت احیا، پیشرفت پوشش زخم‌ها، کنترل مؤثرتر عفونت‌ها، ارتقا درمان آسیب‌های استنشاقی،
حمایت‌های بهتر از پاسخ هیپرمتابولیک ناشی از سوختگی

BOX 20.1 Burn unit organization and personnel.

- Experienced burn surgeons (burn unit director and qualified surgeons)
- Dedicated nursing personnel
- Physical and occupational therapists
- Social workers
- Dietitians
- Pharmacists
- Respiratory therapists
- Psychiatrists and clinical psychologists
- Prosthetists

طبقه‌بندی سوختگی:

شایع‌ترین علت سوختگی، شعله‌های آتش و مایعات داغ می‌باشند.
بیشترین میزان مرگ و میر در محدوده سنی بالا (سالمندان) و پایین (کودکان) می‌باشد.

BOX 20.2 Burn classifications.

Causes of Injury

Flame—damage from superheated oxidized air by convection and radiation

Scald—damage from contact with hot liquids

Contact—damage from contact with hot or cold solids

Chemical—contact with noxious chemicals

Electrical—conduction of electrical current through tissues

Depth of Injury

Superficial—injury confined to the epidermis

Superficial partial-thickness—injury to the epidermis and papillary dermis

Deep partial-thickness—injury to the epidermis and reticular dermis

Full-thickness—injury extending through the epidermis and dermis into subcutaneous fat



تقسیم‌بندی سوختگی بر اساس عمق سوختگی:

سوختگی سطحی (درجه ۱ سابق): تا عمق اپیدرم، سد اپیدرمی سالم است، اسکار به جا نمی‌گذارد، دردنک و اریتماتو، با لمس سفید می‌شود.

مثال: آفتاب سوختگی، تاول در اثر سوختگی ناشی از پخت و پز.

درمان سوختگی درجه ۱: داروهای تسکین دهنده موضعی همراه با یا بدون آلوئهورا + NSAID خوارکی

سوختگی نیمه ضخامت سطحی (درجه ۲ سابق): تا عمق درم سطحی، دردنک است، باعث ایجاد تاول می‌شود، با لمس سفید می‌شود، هفت تا چهارده روز ترمیم می‌یابد، تا مدت‌ها محل ترمیم آن رنگ پریده است.

مثال: سوختگی با آب داغ حمام - جرقه‌های برق.

سوختگی نیمه ضخامت عمقی (درجه ۲ عمقی سابق): تا عمق درم رتیکولر، ایجاد درد با خراش سر سوزن، به صورت لکه لکه و رنگ پریده که با لمس سفید نمی‌شود، پانزده تا بیست و یک روز بهبود می‌یابد، اغلب اسکار می‌دهد، التیام توسط فولیکول‌های مو و کراتینوسیت‌های غدد عرق.

سوختگی تمام ضخامت (درجه ۳ سابق): سوختگی تمام ضخامت اپیدرم و درم، اصلاً درد ندارند، با فشار سفید نمی‌شود، ایجاد اسکار چرمی شکل و سفت، التیام از اپیتلیوم لبه‌های زخم (چون هیچ ضمیمه‌ای از اپیدرم و درم باقی نمی‌ماند). حتماً نیاز به اکسزیون و گرفت پوستی دارد.




FIG. 20.3 Depths of a burn. Superficial burns are confined to the epidermis. Superficial partial-thickness burns are limited to the epidermis and papillary dermis. Deep partial-thickness burns extend through the epidermis and reticular dermis. Full-thickness burns extend through the epidermis and dermis into subcutaneous fat and can involve injury to underlying tissue structures, such as muscle, tendons, and bone.

روش‌های تعیین عمق سوختگی:

- ۱ . دقیق‌ترین روش، تشخیص جراح با تجربه از طریق معاینه سریال و منظم می‌باشد (استاندارد طلایی).
- ۲ . روش لیزدایپلر از طریق اندازه‌گیری میزان پرفیوژن پوست
- ۳ . اولتراسوند غیرتماسی
- ۴ . بیوپسی از تمام ضخامت پوست: در دنک است و باعث ایجاد اسکار می‌شود. تفسیر دقیق آن توسط پاتولوژیست به زمان زیادی نیاز دارد.

تقسیم‌بندی سوختگی بر اساس علت ایجاد‌کننده:

در ۵ گروه شعله‌های آتش، مایعات داغ (scald)، تماس با اشیاء داغ یا سرد، مواد شیمیایی، برق گرفتگی (الکتریکی)

۳ مورد اول با انتقال انرژی باعث تخریب سلولی و نکروز انعقادی می‌شوند.
سوختگی شیمیایی و الکتریکی باعث آسیب مستقیم به غشای سلولی علاوه بر انتقال حرارت شده و باعث نکروز انعقادی یا میعانی می‌شوند.

تعیین وسعت سوختگی:

با استفاده از قانون ندها (۹۶) تعیین می‌شود.

$$\text{هر اندام فوقانی} = \% ۹$$

گزش و گازگرفتگی

فصل ۲۱

Sabiston: Section 21

نکته: اولین اقدام در مارگزیدگی، خارج کردن بیمار از منطقه‌ی خطر است.

TABLE 21.1 Outdated or disproven treatment modalities for snakebites.

X-CUT ASPIRATION	CONSTRICCTOR BAND
Freshly killed bird dressing	Partial or radical excision of wounds
Electrical stimulation	Steroids
Ice—ligature cryotherapy	Heat
Fasciotomy (prophylactic)	Tourniquet




FIG. 21.7 Straightforward algorithm for management of patients with significant envenomation. Dosing is based on an estimate of the degree of envenomation, not on weight.



مراقبت زخم در گازگرفتگی پستانداران:

مهمنترین درمان برای پیشگیری از عفونت و هاری، تمیز کردن زودرس زخم می‌باشد. پوست اطراف زخم باید با بتادین ۱ درصد و یا کلرهگریدین ۲ درصد شستشو داده شود.

از محلول بتادین رقیق شده جهت شستشو می‌توان استفاده کرد، سپس بعد از آن زخم با نرمال سالین یا آب شستشو داده می‌شود.

زخم‌های آلوده و یا حاوی بافت‌های نکروزه باید با گاز تمیز شده و دیرید شوند.

جهت مدیریت زخم ایده‌آل گاهانه نیاز هست که بیمار به اتاق عمل منتقل شده و با بیهوشی جنرال یا بی‌حسی لوکال درمان شود.

گزینه‌های ترمیم زخم شامل بستن اولیه، اولیه تأخیری و ثانویه می‌باشد که بسته به محل آناتومیک، عامل آسیب و نوع آسیب تعیین می‌شود.

در این موارد از بستن اولیه می‌توان استفاده کرد:

۱- زخم‌های سر و گردن که طی ۲۴ ساعت از گازگرفتگی مراجعه کنند (چرا که از نظر زیبایی پراهمیت هستند و ریسک عفونت پایین است).

۲- زخم‌های کم خطر بازو و پا و تنہ که طی ۶-۱۲ ساعت از زمان آسیب مراجعه کنند.

۳- گازگرفتگی‌های شدید انسان و آسیب‌های همراه با avulsion در صورت، که نیازمند فلب هستند، به طور موقتی‌آمیزی با بستن اولیه ترمیم شده‌اند (اگرچه این تکنیک هنوز کنتراورسی می‌باشد).
زخم‌های مستعد عفونت مثل زخم‌هایی که طی ۲۴ ساعت بعد از گازگرفتگی دیده شوند (یا بیش از ۶ ساعت وقته که غضروف گوش و یا بینی درگیر شده باشد)، باید با پانسمان مرطوب پوشیده شده و بعد از ۳ الی ۵ روز به شکل اولیه تأخیری بسته شوند.



BOX 21.1 Animal bite risk factors for infection.

High Risk

Location

Hand, wrist, or foot
Scalp or face in infants (high risk of cranial perforation)
Over a major joint (possible perforation)
Through-and-through bite of a cheek

Type of Wound

Puncture (difficult to irrigate)
Tissue crushing that cannot be debrided
Carnivore bite over a vital structure (artery, nerve, joint)

Patient

>50 years old
Asplenic
Chronic alcoholism
Altered immune status
Diabetes
Peripheral vascular insufficiency
Long-term corticosteroid therapy
Prosthetic or diseased heart valve or joint

Species

Domestic cat
Large cat (deep punctures)
Human (hand bites)
Primates
Pigs

Low Risk

Location
Face, scalp, or mouth

Type of Wound

Large, clean lacerations that can be thoroughly irrigated

Adapted from Keogh S, Callaham ML. Bites and injuries inflicted by domestic animals. In Auerbach PS, ed. *Wilderness Medicine: Management of Wilderness and Environmental Emergencies*. 4th ed. St Louis: Mosby; 2001:961–978.

زخم‌های puncture ریسک عفونت بالایی داشته بنابراین سوچور نمی‌شوند. شستشوی عمقی و اکسیژیون وسیع زخم‌های puncture کوچک، ثابت نشده است که سودمند باشد، در حالی که زخم‌های puncture بزرگتر معمولاً از شستشو و دبریدمان سود می‌برند.
گازگرفتگی توسط سگ به واسطه‌ی دندان‌های نیش، علی‌رغم ظاهر سطحی کوچک، ممکن است سطح زیرین وسیع‌تری را درگیر کرده باشد.

مراقبت‌های بحرانی

فصل ۲۲

Sabiston: Section 22

سیستم نورولوژیک:

Dysfunction: عدم آگاهی به زمان، مکان مشخص و عدم توانایی از پیروی دستورات و افزایش خواب‌آلودگی.

- در هر اپیزود از dysfunction باید دنبال علل ارگانیک بود.

دلیریوم: اختلال در توجه، تمرکز و آگاهی فرد از محیط که در طی دوره زمانی کوتاه ایجاد می‌شود.


Active: به صورت آژیتاسیون بروز می‌کند.

Negative: به صورت لتاژی و بی‌توجهی بروز می‌کند و اغلب تشخیص داده نمی‌شود.

نکته: هر نوع تغییر وضعیت ذهنی در بیماران بحرانی باید علل ارگانیک مثل ICP، تغییر هایپوکسی، داروها و علل متابولیک R/O شوند.

آنسفالوپاتی: اختلال منشر مغزی ناشی از علل ارگانیک یا غیرارگانیک


علل: داروها، توکسین‌ها، علل کبدی و ...



نکته: در تمام بیماران در ICU باید معاینه روزانه نورولوژیک انجام شود و در صورت یافتن علائم لترالیزه انجام CT مغز توصیه می‌شود و اگر علائم منشر بود CT کمک کننده نیست.



نکته: یکی از جنبه‌های مهم ارزیابی نورولوژیک بیماران پرستار ICU است که تغییرات چند ساعت گذشته بیمار را می‌تواند دقیق در اختیار پزشک بگذارد. تجویز مسکن در ICU بسیار مهم است، تجویز بیش از حد عوارضی از جمله دپرسیون تنفسی، هایپوتنشن، پنومونی و تجویز کمتر از استاندارد آنالژی عوارضی مثل احساس درد، اضطراب، MI، اکستوباسیون غیربرنامه‌ریزی شده را به همراه دارد.





در همراهی با اپیوئیدها برای کنترل درد استفاده می‌شوند.

:NSAID

mekanisim: بلوك توليد پروستاگلاندين ها

- نارسایی کلیه

عارض

GIB

در افراد مسن و نارسایی کلیه بسیار با احتیاط استفاده شود.

به عنوان Opioid sparing

استامینوف:

فرم تزریقی اثر بهتری از رکتال و خوراکی دارد.

فرم وریدی باید حداقل در عرض ۱۵ دقیقه تزریق شود.

در اولین فرصت باید تجویز مداوم دارو قطع شود.

راه‌های تجویز دارو و

مسکن

در بیماری که تحمل PO دارد دارو خوراکی تجویز شود.

در بیماران هوشیار بهترین راه PCA است ولی ممکن است دوز بیشتری

از اپیوئید مصرف شود.

در جراحی شکم و توراکس بسیار کارآمد است.

اپیدورال

کاهش ایلثوس، آریتمی، DVT، تهوع، استفراغ و

دپرشن تنفسی

اپیزودهای هایپوتنشن از عوارض این روش است.

نقش جراحان در بلایای بزرگ

فصل ۲۴

Sabiston: Section 24

موج زیاد مجروحان

می‌باشد.

وجه مشترک تمام سناریوهای بزرگ

حدودیت منابع




FIG. 24.1 Typical injury severity breakdown for an average mass casualty event. Note that only 20% of patients will have severe or immediately life-threatening injuries, and 50% or more will have minor or minimal injuries.

تربیاز:

- رهبر اصلی پروسه تربیاز در MASCAL = جراح
 - یک پروسه متوالی است و بارها باید از زمان بروز حادثه تا انتقال بیماران به بیمارستان انجام شود.
- نکته: تربیاز می‌تواند بدون وجود MASCAL انجام شود، اما همواره نیازمند تربیاز است.
- در صحنه حادثه توسط EMS انجام می‌گیرد.
 - زمانی که بیماران شدیداً آسیب دیده به مراکز دارای عدم امکانات کافی فرستاده شوند.
 - زمانی که بیماران با آسیب‌های مینور یا Nonurgent به مراکز مأذون ترموما فرستاده می‌شوند.




FIG. 24.2 Graphic relation of overtriage rate to critical mortality rate, in ten terrorist bombing incidents from 1969 to 1995, demonstrating linear increase in mortality with higher overtriage rates. Linear correlation coefficient (r) 0.92. (From Frykberg ER. Medical management of disasters and mass casualties from terrorist bombings: how can we cope? *J Trauma*. 2002;53:201–212.) AMIA, Buenos Aires; BE, Beirut; Bol, Bologna; BP, Birmingham pubs; CA, Craigavon; CC, Cu Chi; GP, Guildford pubs; OB, Od Bailey; OC, Oklahoma City; TL, Tower of London.




FIG. 24.3 Graphic depiction of the results of a computer simulation of the flow of casualties of an urban bombing through the trauma service line of an urban trauma center and the impact on the global level of care. The level of care for a single patient on a normal working day is defined as 100%. The upper flat portion of the curve corresponds to an MCI, the steep portion represents a mass casualty situation, and the lower flat portion represents a major medical disaster. The surge capacity of the hospital trauma service line is the maximal critical casualty load that can be managed without a precipitous drop in the level of care. (From Hirshberg A, Scott BG, Granchi T, et al. How does casualty load affect trauma care in urban bombing incidents? A quantitative analysis. *J Trauma*. 2005;58:686–693.)



۱۰ اصل مهم MASCAL

- ۱- تریاژ یک پروسه‌ی دینامیک از صحنه‌ی حادثه تا بیمارستان است.
- ۲- هدف MASCAL : بهترین اقدام را برای اکثریت، نه همه چیز را برای همه، انجام دهید.
- ۳- موفقیت سیستم تروما بستگی به field triage دقیق و موثر دارد.
- ۴- تریاژ با ارزیابی امکانات، منابع و پرسنل موجود در سیستم شروع می‌شود.
- ۵- برای تریاژ داخل بیمارستان، بیماران باید از طریق یک نقطه ورود و مسیر یک طرفه به سمت امکانات هدایت شوند.
- ۶- در یک سیستم تحت فشار باید امکانات زیاد شود، نه اینکه فعالیت‌ها دو برابر شود.
- ۷- برگه‌های کاغذی یا الکترونیک از پیش آمده، جهت چارت و پذیرش بیماران حین تریاژ باید آماده باشد.
- ۸- بهترین سیستم تریاژ مناسب مرکز خود را انتخاب و به پرسنل خود آموزش دهید.
- ۹- مدیر تریاژ باید از با تجربه‌ترین و سازمان یافته‌ترین پرسنل باشد.
- ۱۰- برای مراقبت موثر، باید امنیت و ایمنی صحنه حادثه برقرار گردد. خودتان قربانی نشوید!

BOX 24.1 Simple mnemonic for TRIAGE.

T Training (in-hospital response/local)
R Readiness (regional/field triage readiness)
I Integration of Systems
A Adaptable
G Grow (remember system lessons learned)
E Exsanguination Control (along the continuum)

شکم حاد

فصل ۶۴

Sabiston: Section 46

واژه‌ی شکم حاد به علائم و نشانه‌های درد و تندرننس شکمی گفته می‌شود که معمولاً نیاز به درمان جراحی پیدا می‌کند. این سناریو چالش برانگیز به بررسی کامل و سریع جهت مشخص کردن نیاز به مداخله‌ی جراحی و شروع درمان مناسب نیاز دارد. بسیاری از شرایط که برخی از آن‌ها نیازمند جراحی و یا حتی داخل شکمی نیستند می‌توانند باعث درد شکم حاد و تندرننس شوند. بنابراین تمام تلاش‌ها جهت تشخیص صحیح باید صورت گیرد تا درمان انتخابی مناسب که معمولاً لاپاراتومی و یا لاپاراسکوپی است، انجام شود. علی‌رغم پیشرفت‌های آزمایشگاهی و تصویربرداری، شرح حال و معاینه بالینی به عنوان اساس تشخیص صحیح و شروع درمان مناسب و به موقع باقی مانده است.

تشخیص‌های مرتبط با شکم حاد بر اساس سن و جنس، متغیر هستند. به عنوان مثال آپاندیسیت بیشتر در افراد جوان شایع است در حالی که بیماری‌های صفراء، انسداد روده، ایسکمی و انفارکتوس روده و دیورتیکولیت بیشتر در افراد مسن شایع است. بیشتر این تشخیص‌ها نتیجه عفونت، انسداد، ایسکمی و یا پرفوراسیون هستند.

علل غیرجراحی شکم حاد را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: ۱- آندوکرین و متابولیک ۲- هماتولوژیک ۳- سموم و داروها

علل آندوکرین و متابولیک شامل اورمی، کریز دیابتیک، کریز آدیسون، پورفیری متناوب حاد، هایپرلیپوپروتئینمی حاد و تب مدیترانه‌ای ارثی می‌شود. اختلالات هماتولوژیک شامل کریز سلول داسی، لوکمی حاد و سایر دیس کرازی‌های خونی. سموم و داروها شامل مسمومیت با سرب و سایر فلزات سنگین، محرومیت از مواد مخدر و مسمومیت با سم عنکبوت بیوهی سیاه است.

در نظر داشتن این احتمالات حین بررسی بیمار با درد شکمی حاد مهم است. به دلیل ماهیت جراحی شکم حاد بررسی سریع ضروری است. بررسی با روند معمول شرح حال، معاینه فیزیکی، آزمایشات و تصویربرداری پیش می‌رود. اگرچه مطالعات تصویربرداری دقیق‌تر تشخیص را بالا برده است ولی همچنان مهم‌ترین قسمت بررسی یک شرح حال کامل و معاینه بالینی دقیق است. مطالعات



آزمایشگاهی و تصویربرداری اگرچه معمولاً مورد نیاز هستند ولی بر اساس یافته‌های شرح حال و معاینه‌ی فیزیکی هدایت می‌شوند.

BOX 46.1 Nonsurgical causes of the acute abdomen.

Endocrine and Metabolic Causes

- Acute intermittent porphyria
- Addisonian crisis
- Diabetic crisis
- Hereditary Mediterranean fever
- Uremia

Hematologic Causes

- Acute leukemia
- Sickle cell crisis

Toxins and Drugs

- Black widow spider poisoning
- Lead poisoning
- Other heavy metal poisoning
- Narcotic withdrawal



BOX 46.2 Surgical acute abdominal conditions.

Hemorrhage

Aortoduodenal fistula after aortic vascular graft
Arteriovenous malformation of the gastrointestinal tract
Bleeding gastrointestinal diverticulum
Hemorrhagic pancreatitis
Intestinal ulceration
Leaking or ruptured arterial aneurysm
Mallory-Weiss syndrome
Ruptured ectopic pregnancy
Solid organ trauma
Spontaneous splenic rupture

Infection

Appendicitis
Cholecystitis
Diverticulitis
Hepatic abscess
Meckel diverticulitis
Psoas abscess

Ischemia

Buerger disease
Ischemic colitis
Mesenteric thrombosis or embolism
Ovarian torsion
Strangulated hernia
Testicular torsion

Obstruction

Cecal volvulus
Gastrointestinal malignancy
Incarcerated hernias
Inflammatory bowel disease
Intussusception
Sigmoid volvulus
Small bowel obstruction

Perforation

Boerhaave syndrome
Perforated diverticulum
Perforated gastrointestinal cancer
Perforated gastrointestinal ulcer

Ac
Go



فصل ۶۴

Sabiston: Section 64

ترومای عروقی

أنواع مكانيسم آسيب عروقی:

- ۱) نافذ ← ساختارهایی که در مسیر جسم نافذ هستند ممکن است همراه عروق آسیب ببینند.
- ۲) بلانت ← آسیب وسیع، تخریب همزمان عضله و عصب و عروق کوچک ← احتمال بیشتر ایسکمی اندام



- وقتی آسیب هر سه لایه رگ (اینتیما - مدیا - ادوانتیس) داشته باشیم خونریزی اتفاق می‌افتد. اگر رگ کامل cut شود سر آن به داخل بافت کشیده شده و اسپاسم می‌کند و خونریزی متوقف می‌شود.
- ✓ اگر آسیب رگ پارشیال باشد نمی‌تواند به داخل کشیده شود و انقباض کند و در نتیجه خونریزی ادامه پیدا می‌کند.
 - ✓ لایه ادوانتیس رگ ترومبوژنیک است و به دنبال ترومبوز رگ خونریزی کم می‌شود.



آسیب‌های تحت حاد در ترومای عروقی:

در اثر آسیب همزمان شریان و ورید VAF (۱) می‌تواند علائم موضعی یا سیستمیک بدهد.

در اثر آسیب جدار شریان (۲) سودوآنوریسم به مرور ممکن است رشد کند.
علائم فشاری روی ساختارهای اطراف یا فرستادن آمبولی دیستال

تظاهرات بالینی:

از شوک هموراژیک تا بروئی بدون علامت

آسیب ۵ ناحیه آناتومیک می‌تواند باعث شوک هموراژیک شود:

۱) سر و گردن ← زمانی منجر به شوک می‌شود که خونریزی اکسترناל داشته باشیم.

۲) اندامها ← زمانی منجر به شوک می‌شود که خونریزی اکسترنال داشته باشیم.

(۳) شکم

(۴) توراکس

(۵) لگن

نکته: خونریزی که باعث افت فشار شود ممکن است باعث ترومبوز رگ شود، پس باید شرح حال دقیق از پرسنل اورژانس که بیمار را آورده‌اند پرسیده شود.

نکته: در آسیب‌های عروقی تعداد کمی از بیماران در ابتدا بدون علامت هستند و ممکن است به صورت تأخیری علامتدار شوند مثل سودوآنوریسم.



معاینه:

علائم سیستمیک ← افت فشار، تاکیکاردی، افت GCS

درمان بر اساس اصول ATLS است یعنی اول راه هوایی و تنفس و سپس برقراری IV Line و احیا و ...

معاینه کامل شامل زخم‌ها، نبض‌ها

در صورت کاهش نبض باید با داپلر continuous wave ارزیابی شود، اختلاف بیشتر از ۱۰ mmHg نشانگر آسیب عروق است.

Hard sign ← مستقیم به OR انتقال داده می‌شود.

Soft sign ← ابتدا تصویربرداری انجام می‌شود.

نکته: در موارد بیمارانی که Hard sign دارند اما اندام در مناطق مختلف آسیب دیده است و محل آسیب رگ مشخص نیست نیز اول تصویربرداری انجام می‌شود.

TABLE 64.1 History and physical examination findings of vascular injury.

Hard Findings

Indicate need for immediate intervention for vascular injury

- Pulsatile bleeding
- Expanding hematoma
- Palpable thrill or audible bruit
- Evidence of extremity ischemia
 - Pallor
 - Paresthesia
 - Paralysis
 - Pain
 - Pulselessness
 - Poikilothermia

Soft Findings

- Consider further imaging and evaluation for vascular injury
- History of moderate hemorrhage
- Proximity fracture, dislocation, or penetrating wound
- Diminished but palpable pulse
- Level of peripheral nerve deficit in proximity to major vessel
- Wounds in proximity to extremity or neck vessels in patients with unexplained hemorrhagic shock

روش‌های تصویربرداری:

(۱) کاتر آرتریوگرافی

جراحی در بارداری

فصل ۷۲

Sabiston: Section 72


TABLE 72.1 Operations performed out of 6.5 million pregnancies in the United Kingdom from 2002–2012.


NUMBER OF OPERATIONS (%)	
Abdominal, any kind	12493 (26.2)
Appendectomy	3062 (6.4)
Cholecystectomy	1306 (2.7)
Dental	5365 (11.3)
Skin, nail	4762 (10.0)
Orthopedic	4563 (9.6)
ENT	3060 (6.4)
Perianal	2977 (6.2)
Breast	1884 (4.0)
Cancer	710 (1.5)

Adapted from Balinskaite V, Bottle A, Sodhi V, et al. The risk of adverse pregnancy outcomes following nonobstetric surgery during pregnancy: Estimates from a retrospective cohort study of 6.5 million pregnancies. *Ann Surg*. 2017;266:260–266. ENT, Ear, nose, and throat.

تغییرات فیزیولوژیک بارداری:

تغییرات اصلی مربوط به دو هورمون استروژن و پروژسترون است که بیشترین تغییر را در توده عضلانی می‌گذارند و باعث شل شدن عضلات می‌شوند.





- * خطر سنگ صفرا با افزایش تعداد بارداری‌ها افزایش می‌یابد و شیوع لجن صفراوی از سنگ بیشتر است.
- * ↑ استروژن ← پالمار اریتم و اسپایدر آنژیوما در دست‌ها و پوست
- * افزایش کلسترول، Alp، فیرینوژن، آزمایشات

دستگاه قلبی عروقی:

MAP ↓ DBP کاهش ← SBP بدون تغییر،

سندروم افت فشار وضعیتی به ویژه در حین القای بیهوشی که داروها پاسخ سمپاتیک را مختل کرده است.

↑ فشار وریدی اندام تحتانی ← ↑ واریس

↑ حجم رحم باعث


برجسته شدن وریدهای لیگامان گرد رحمی ← برجسته شدن ناحیه اینگوینال و احتمال اشتباه شدن با هرنی ← باید سونو در صورت شک درخواست شود.

سیستم هماتولوژی:

- لکوسیتوز تا ۱۶ هزار
- ↑ سطح فاکتورهای ۲، ۵، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۲ و فاکتور فون ویل براند
- Pro C - ثابت، Pro S کاهش، فاکتور ۱۱ کاهش

دستگاه تنفسی:

- بالا رفتن دیافراگم تا ۴ سانت و افزایش قطر قفسه سینه تا ۷ سانت
- افزایش مصرف اکسیژن
- انتقال منحنی تفکیک اکسیژن به سمت راست ← نبود تبادل اکسیژن بین جنین و مادر



دستگاه ادراری:

- کاهش Cr به ۰/۵ در انتهای بارداری
- ↑ رنین و آنژیوتانسین ← ↑ بازجذب Na
- کاهش اسمولالیتی سرم تا حد ۲۷۰-۲۸۰

تصویربرداری در حاملگی:

- حداکثر دوز مورد توافق: ۵ راد، در دوز بالای ۱۰ راد سقط خودبهخود اتفاق می‌افتد.
- بیشترین خطر ← تا هفته ۱۵ و بیشترین تأثیر روی سیستم CNS و افزایش خطر لوکمی و بدخیمی‌های خاص در کودکی

فلوروسکوپی: باید کمترین دوز ممکن و کمترین زمان را مد نظر بگیریم به ویژه در سه ماهه اول و اوایل سه ماهه دوم بیشترین خطر را دارد.

MRI: در سه ماهه اول نباید استفاده شود.

کنتراست: کنتراست برای CT خطر هایپرتیروئیدی جنین دارد و GAD برای MRI خیلی با احتیاط باید استفاده شود.

سونو: خطر خاصی ندارد.

TABLE 72.2 Fetal radiation exposure with radiographic imaging.

EXAMINATION TYPE	ESTIMATED FETAL RADIATION EXPOSURE (cGy)
Two-view chest radiography	0.00007
Cervical spine radiography	0.002
Pelvis radiography	0.04
Head CT	<0.050
Abdomen CT	2.60
Upper GI series	0.056
Barium enema	3.986
HIDA scanning	0.150

CT, Computed tomography; GI, gastrointestinal; HIDA, hepatobiliary iminodiacetic acid.