



# اختلالات جنسی و نارضایتی جنسی

ویژه آزمون ارتقاء و بورد تخصصی ۱۴۰۳

## ترجمه و تلفیق

دکتر مهشید ناصری سینگی

بورد تخصصی روانپزشکی

رتبه برتر بورد تخصصی کشوری سال ۱۴۰۱



## فهرست مطالب

۱۱.....	Human sexuality and sexual dysfunction-16
۸۵.....	سوالات و پاسخنامه فصل ۱۶
۱۰۱.....	Gender dysphoria, Gender identity and related conditions-17
۱۱۵.....	سوالات و پاسخنامه فصل ۱۷
۱۴۵.....	فصل ۱.۱- ویژگی‌های جنسی نرمال انسان و اختلالات sexual (کامپرہنسیو)
۲۱۰.....	فصل ۱.۲- هم‌جنس‌گرایی، هویت هم‌جنس‌گرایانه مردانه و زنانه (Lesbian & Gay) و رفتارهای هوموسکچوال (کامپرہنسیو)
۲۱۹.....	فصل ۱.۳- پارافیلیا
۲۲۹.....	فصل ۱.۴- هویت جنسی، gender dysphoria و gender variance (کامپرہنسیو)
۲۳۷.....	فصل ۱.۵- اعتیاد جنسی
۲۵۱.....	فصل ۱.۶- Gender Dysphoria
۲۶۵.....	سوالات و پاسخنامه بر اساس کامپرہنسیو ۲۰۱۷



# فصل ۱۶

Section 16

## Human sexuality and sexual dysfunction

اختلالات جنسی را می‌توان در دو دسته‌ی اصلی جای داد:

- (۱) اختلالات عملکرد جنسی
- (۲) پارافیلیا

### اختلالات عملکرد جنسی (Sexual dysfunction)

از ویژگی‌های اساسی این اختلالات، عدم توانایی پاسخ‌دهی به تحریک جنسی یا احساس درد حین فعالیت جنسی است.

اختلال می‌تواند به شکل عدم تجربه‌ی ذهنی لذت‌بخش در حین سکس، مشکل در میل جنسی یا عملکرد جنسی باشد.

طبق ICD10، اختلالات عملکرد جنسی این‌گونه تعریف می‌شود:  
عدم توانایی فرد برای شرکت در فعالیت جنسی آن‌گونه که خودش تمایل دارد.

اختلالات عملکرد جنسی در DSM5 شامل این موارد است:

Male hypoactive sexual desire disorder (۱)

Female sexual interest / arousal disorder (۲)

Erectile disorder (۳)

Female orgasmic disorder (۴)

Delayed ejaculation (۵)

Premature / early ejaculation (۶)

Genito pelvic pain / penetration disorder (۷)



Substance / medication induced sexual dysfunction (۸)

Other specified sexual dysfunction (۹)

Unspecified sexual dysfunction (۱۰)

زمانی می‌توان تشخیص اختلال عملکرد جنسی را گذاشت که باعث افت عملکرد شخص شده و در صورت بروز چند اختلال همزمان، باید چند تشخیص را با هم گذاشت. این اختلالات می‌توانند اکتسابی باشند یا از ابتدای شروع فعالیت جنسی وجود داشته باشند و در همه‌ی شرایط یا در موقعیت‌های خاصی وجود داشته باشند.

اگر اختلال به علت مشکل مدلکال ایجاد شده باید تشخیص sexual dysfunction due to a general medical condition ← گذاشته شود.

DSM5 شدت اختلال را بر اساس میزان دیسترس ایجاد کرده به سه دسته severe و moderate و mild تقسیم کرده است.

اختلالات عملکرد جنسی اغلب با سایر بیماری‌های اعصاب و روان مثل اختلالات خلقی / اضطرابی / شخصیت و اسکیزوفرنی همراهی دارند. اگر اختلال جنسی بیشتر در زمینه‌ی اختلال روانپزشکی زمینه‌ای فرد ایجاد شده، فقط باید تشخیص اختلال روانپزشکی زمینه‌ای را برای فرد بگذاریم. برای گرفتن شرح حال جنسی می‌توان با سوال‌های باز شروع کرد.

# Gender dysphoria, Gender identity and related conditions

## فصل ۱۷

Section 17



اصطلاح Gender Identity (هویت جنسی) به احساس فرد از زن یا مرد بودن خود، گفته می‌شود که اغلب متناسب با آناتومی فرد است.

• **Gender Dysphoria (نارضایتی جنسیتی):** به عدم رضایت فرد از جنسیت خود و تمايل برای داشتن بدن جنس مخالف یا تمايل به داشتن هویت اجتماعی جنس مخالف گفته می‌شود. این اصطلاح برای اولین بار در DSM5 آورده شده. در ویراست قبلى DSM به آن gender identity disorder (اختلال هویت جنسی) گفته می‌شد.

• در ICD10 مسائل مربوط به هویت جنسی در زیرمجموعه disorders of adult behavior and personality و در طبقه gender identity disorders آورده شده و شامل این تشخیص هاست: (۱) other (۲) gender identity disorder of childhood (۳) dual-role transvestic (۴) Transsexualism unspecified (۵) gender identity disorder (۶) identity disorder ← gender در ICD11 پیشنهاد شده که مسائل مربوط به هویت جنسی، از قسمت مسائل سایکولوژیکال به قسمتی جداگانه تحت عنوان تشخیص‌های مدبکال یا به قسمت sexual health and sexual disorders منتقل شود.



### (تراجنسيتي) Transgender •

افرادی هستند که می‌خواهند بدن جنس مقابله داشته باشند، ۲) افرادی که احساس می‌کنند بین جنسیت‌ها قرار دارند، ۳) افرادی که احساس می‌کنند به هیچ‌کدام از دو جنس تعلق ندارند (gender) و ۴) مبدل پوش‌ها (cross dressers) که هویت جنسی‌شان مطابق با هویت بعد تولدشان است ولی لباس‌های جنس مقابله را می‌پوشند. برخلاف باور عمومی، اکثر این افراد جراحی روی ناحیه ژنیتال انجام نمی‌دهند که علت آن عدم تمایل فرد یا مشکلات مالی است. تمایلات جنسی این افراد می‌توانند به هر شکلی باشند، برای مثال یک مرد ترنس جندر که در بدو تولد مؤنث بوده، ممکن است هم‌جنس‌گرا باشد.

### تشخیص و خصوصیات بالینی:



ویژگی‌های جنسی

نرمال انسان

و اختلالات sexual


## فصل ۲۱-۱

Section 21-1



Table 21.1-1.  
Responses of Sex Organs to Autonomic Nerve Impulses

Effector Organs	Receptor Type	Adrenergic Impulses		Cholinergic Impulses Responses
		Responses		
Urinary bladder				
Detrusor	$\beta_2$	Relaxation (usually)		Contraction
Trigone and sphincter	$\alpha_1$	Contraction		Relaxation
Ureter				
Motility and tone	$\alpha_1$	Increase		Increase (?)
Uterus	$\alpha_1, \beta_2$	Pregnant: contraction ( $\alpha_1$ ), relaxation ( $\beta_2$ ); nonpregnant: relaxation ( $\beta_2$ )		Variable
Sex organs, male	$\alpha_1$	Ejaculation		Erection
Skin				
Pilomotor muscles	$\alpha_1$	Contraction		
Sweat glands	$\alpha_1$	Localized secretion		Generalized secretion



**FIGURE 21.1-3.** Differentiation of male and female external genitalia from indifferent primordial. Male differentiation occurs only in the presence of androgenic stimulation during the first 12 weeks of fetal life.

## فصل ۲۱-۲

Section 21-2

هم جنس‌گرایی، هویت  
هم جنس‌گرایانه مردانه و زنانه (Lesbian & Gay)  
و رفتارهای هوموسکچوال

(۹۵) مربوط به کدام حیطه است؟ (مشهد)

Sexual identity (الف)

Gender identity (ب)

sexual Orientation (ج)

sexual Behavior (د)

پاسخ: ج

Sexual orientation		
Person's sex	androphilic attracted to males person's sex not specified	gynephilic attracted to females person's sex not specified
male sexual orientation not specified	homosexual androphilic male	heterosexual gynephilic male
female sexual orientation not specified	heterosexual androphilic female	homosexual gynephilic female



# پاراافیلیا

## فصل ۲۱-۳

Section 21-3



برای احراز تشخیص چشم‌چرانی (Voyeurism) بر مبنای معیارهای DSM-IV-TR، حداقل زمان

لازم برای تداوم فانتزی‌های جنسی و رفتارهای مشاهده‌گری شهوانی مکرر و شدید چقدر است؟

(تبریز) (۹۵)

ب) شش ماه

الف) یک ماه

د) معیار زمانی ذکر نشده است.

ج) سه ماه

پاسخ: ب



اپیدمیولوژی:



هویت جنسی،

Gender Variance

و Gender

dysphoria

## فصل ٤-٢١

Section 21-4



- جنس (sex) :
- واژه جنسیت (gender) :
- هویت جنسیتی (gender identity) :
- نقش جنسیتی (gender role) :
- Transgender :





### Gender Dysphoria in children



والدین دختر ۹ ساله‌ای جهت مشاوره در خصوص سلامت جنسی دختر خود مراجعه کرده‌اند. به گفته ایشان دختر از ۱/۵ سال قبل اشاراتی در خصوص آرزوی پسر بودن داشته است. وی چندین نوبت در خصوص آزادی‌های برادر بزرگ‌ترش صحبت کرده، پسر بودن را یک مزیت می‌داند و اشاره می‌کند که پوشیدن لباس‌های آستین کوتاه و شلوار خیلی راحت‌تر از پوشیدن مانتو، مقنعه و چادر است. کدامیک از عبارات زیر را در خصوص این دختر مناسب می‌دانید؟

(مشهد ۹۴)

الف) وی مبتلا به اختلال هویت جنسی دخترانه به پسرانه است.


ب) وی مبتلا به اختلال مبدل پوشی پسرانه است.

ج) وی مبتلا به اختلال یادگار خواهی همراه مبدل پوشی است.

د) وی لزوماً دچار اختلال هویت جنسی نمی‌باشد.

پاسخ: د


### Gender Dysphoria in Adolescent and Adult




# اعتیاد جنسی

## ۲۱-۵ فصل

Section 21-5



تشخیص‌های افتراقی





کوموربیدیتی:



## فصل ۱۸

Section 18

# Gender Dysphoria sexual

: Gender dysphoria

: Gender Identity

: Transgender

: Transgender انواع افراد





اپیدمیولوژی:

کودکان:



بزرگسالان:

اتیولوژی:

عوامل سایکوسوшиال:

