



سرشناسه عنوان و نام پدیدآور	پورندیم، مرجان، ۱۳۶۰- دقیقه نود آزمون (بیماری‌های داخلی جراحی B): آزمون ورودی به کارشناسی ارشد پرستاری طبقه‌بندی سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۴۰۲ / گردآوری و تدوین مرجان پورندیم. تهران: کاردیا، ۱۴۰۳. ۲۸۴ ص. ۳۴۰۰۰۰ ریال 978-622-404-004-6
مشخصات نشر مشخصات ظاهری شابک	فیپا روان پرستاری -- آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی) Psychiatric nursing -- Examinations, questions, etc. (Higher) آزمون دوره‌های تحصیلات تکمیلی -- ایران Graduate Record Examination -- Iran RC۴۴۰ ۶۱۰/۷۳۶۸۰۷۶ ۹۵۵۵۷۸۹ فیپا
وضعیت فهرست نویسی موضوع	رده بندی کنگره رده بندی دیویی شماره کتابشناسی ملی اطلاعات رکورد کتابشناسی

چاپ و لیتوگرافی: رزیدنت‌یار نوبت چاپ: اول ۱۴۰۳ تیراژ: ۱۰۰ نسخه شابک: ۶-۴۰۴-۰۰۴-۶۲۲-۹۷۸ بهاء: ۳۴۰۰۰۰ تومان	دقیقه نود آزمون (بیماری‌های داخلی جراحی B) آزمون ورودی به کارشناسی ارشد پرستاری طبقه‌بندی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۴۰۲ گردآوری و تدوین: مرجان پورندیم ناشر: انتشارات کاردیا صفحه‌آرا: رزیدنت‌یار - منیرالسادات حسینی طراح و گرافیکست: رزیدنت‌یار - مهرداد فیضی
--	--

آدرس: تهران میدان انقلاب - کارگرد جنوبی - خیابان روانمهر - بن بست دولتشاهی پلاک ۱ واحد ۱۸
شماره تماس: ۶۶۴۱۹۵۲۰-۰۲۱، ۸۸۹۴۵۲۰۸-۰۲۱، ۸۸۹۴۵۲۱۶-۰۲۱

www.residentvar.com

هر گونه کپی‌برداری از این اثر پیگرد قانونی دارد.

دقیقه نود آزمون

(بیماری‌های داخلی جراحی B)

آزمون ورودی به کارشناسی ارشد پرستاری

طبقه‌بندی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۴۰۲

گردآوری و تدوین

مرجان پورندیم



فہرست مطالب

- فصل دہم: گوارش ۹
- فصل یازدہم : غدد و متابولیسزم ۳۷
- فصل دوازدہم : کلیہ و مجاری ادرار ۶۳
- فصل سیزدہم : زنان ۸۷
- فصل چہار دہم: پوست و سوختگی ۹۷
- فصل پانزدہم: چشم و گوش ۱۱۹
- فصل شانزدہم: مغز و اعصاب ۱۴۰
- فصل ہفدہم: عفونی و اورژانس ۱۷۷

فصل ۱۰

گوارش

۱) در بررسی وضعیت تغذیه‌ای بیمار مبتلا به کولیت اولسراتیو با تغذیه دهانی، پرستار متوجه می‌شود که بیمار هنوز اسهال دارد و نسبت به چند روز قبل دچار کاهش وزن شده و تعادل منفی نیتروژن مطرح است. کدام مورد به منظور حمایت تغذیه‌ای صحیح است؟ (وزارت بهداشت ۱۴۰۱)

- الف) تغذیه لوله‌ای بینی - معدی
ب) تغذیه لوله‌ای بینی - ژژنوم
ج) تغذیه کامل وریدی
د) گاستروستومی

۲) کدام یک از مقادیر مرتبط با شاخص توده بدنی (BMI)، در طبقه‌بندی چاقی درجه دو (Class 2) قرار می‌گیرد؟ (وزارت بهداشت ۱۴۰۰)

الف) ۲۵-۲۹/۹

ب) ۳۰-۳۴/۹

ج) ۳۵-۳۹/۹

د) بیشتر از ۴۰

۳) در بیماران دچار سندرم دامپینگ متعاقب جراحی در سرطان معده، پرستار کدام اقدام را توصیه می‌کند؟ (وزارت بهداشت ۹۹)

- الف) مصرف شش وعده غذایی روزانه با شکر و کربوهیدرات پایین
ب) نوشیدن مایعات مقوی همراه با مصرف غذا
ج) مصرف قرص‌های حاوی پروتئین و ویتامین B12 به طور روزانه
د) تطابق با این عارضه برای همه‌ی عمر

۱) پاسخ: « ج »

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

۲) پاسخ: « ج »

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

۳) پاسخ: « الف »

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

فصل ۱۲

کلیه و مخاری ادرار

۱) خانم ۴۰ ساله با سابقه عفونت پیلونفریت مزمن، با درد شدید پهلو که به کشاله ران و کف پرینه تیر می کشد به همراه تهوع و استفراغ به اورژانس مراجعه کرده است. در بررسی به عمل آمده برای وی سنگ کلیه تشخیص داده شد. به منظور کنترل درد در مددجوی فوق چه اقدامی صحیح تر است؟ (وزارت بهداشت ۱۴۰۱)

- الف) استفاده از تکنیک‌های غیردارویی کنترل درد
- ب) تزریق داروی شل کننده عضلانی
- ج) مصرف ضدالتهاب غیراستروئیدی خوراکی
- د) مصرف مخدرهای تزریقی

۲) آقای ۵۵ ساله با تشخیص سرطان پروستات، دارای سابقه فشار خون، رادیکال پروستاتکتومی شده است. برای کنترل فشار خون بیمار کدام دسته از داروهای زیر احتمال بی‌اختیاری ادرار مددجو را تشدید می‌نماید؟ (وزارت بهداشت ۱۴۰۱)

- الف) مهارکننده کانال‌های کلسیمی
- ب) مهارکننده گیرنده‌های آلفا آدرنرژیک
- ج) مهارکننده آنژیوتانسین - آلدسترون
- د) مهارکننده گیرنده‌های بتا

۳) به عنوان یک پرستار دستورالعمل تغذیه‌ای بیماران تحت عمل جراحی یورتروسیگموئیدوستومی (Ureterosigmoidostomy) کدام موارد زیر را مد نظر قرار می‌دهید؟ (وزارت بهداشت ۱۴۰۰)

- الف) تشویق به جویدن آدامس
- ب) دریافت نمک به میزان لازم
- ج) افزایش دریافت پتاسیم
- د) مواد تغذیه‌ای گازدار

فصل ۱۵

چشم و گوش

۱) در مراقبت از بیماران پس از عمل جراحی کاتاراکت، کدام مورد صحیح است؟
(وزارت بهداشت ۱۴۰۱)

- الف) گزارش جرقه زدن با بروز نقاط نورانی در جلوی چشم
ب) پوشیدن پد چشمی در سمت جراحی شده به مدت یک هفته
ج) استفاده از قطره‌های گشاد کننده مردمک به مدت ۶ ساعت
د) خوابیدن به سمت چشم جراحی شده در شبها

۲) کدام یک از رویکردهای زیر ارتباط با مددجوی دارای اختلال شنوایی را تسهیل نمی‌کند؟ (وزارت بهداشت ۱۴۰۱)

- الف) تکرار صحبت
ب) صحبت با صدای بلند
ج) استفاده از تغییر حالات چهره
د) استفاده از روش نوشتاری
- ۳) پرستار در ضمن بازدید از مدرسه متوجه دانش آموز منزوی، با عملکرد درسی ضعیف توأم با بوی متعفن در مجرای گوش، می‌شود. احتمال وجود کدام التهاب گوش وجود دارد؟ (وزارت بهداشت ۱۴۰۰)

- الف) گوش میانی و داخلی
ب) گوش داخلی
ج) گوش میانی
د) گوش خارجی

۴) پرستار استفاده از عینک آفتابی را برای کاهش ناراحتی بیماران مبتلا به توصیه می‌نماید. (وزارت بهداشت ۱۴۰۰)

- الف) یووئیت
ب) کونژکتیویت
ج) بلفاریت
د) گلوکوم

فصل ۱۷

عفونی و اورژانس

۱) در سیستم برجسب رنگی (تریاز) کدام رنگ به معنی فوریت‌های تأخیر (delayed) بوده و مربوط به مددجویانی است که می‌توان مداخلات درمانی را در مورد آن‌ها حتی ۴ الی ۶ ساعت به تأخیر انداخت و نیاز به درمان اورژانس ندارند؟ (وزارت بهداشت ۹۸-۹۷)

- الف) زرد
ب) قرمز
ج) سبز
د) آبی

۲) در مورد احتیاطات لازم پس از تماس پوستی یا خونی پرستار با بیمار مشکوک به HIV، کدام صحیح است؟ (وزارت بهداشت ۹۲-۹۱)

- الف) شروع داروهای پروفیلاکسی طی مدت دو ساعت پس از تماس
ب) ادامه درمان داروهای پروفیلاکسی تا دو ماه پس از تماس
ج) انجام آزمایش از بیمار مشکوک حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از تماس
د) انجام آزمایشات پیشگیری برای پرستار تا سه ماه بعد از تماس

۳) مؤثرترین اقدام جهت دفع منواکسید کربن از خون در مسمومین با این گاز کدام است؟ (وزارت بهداشت ۹۱-۹۰)

- الف) تجویز اکسیژن ۱۰۰ درصد
ب) تجویز اکسیژن پر فشار (هیپرباریک)
ج) رساندن اکسیژن با ماسک ونچوری
د) دیالیز سریع بیمار

فصل ۱۸

سایر تست‌ها

۱) دلیل تزریق داروهای آنتی کولینرژیک قبل از عمل جراحی که توسط پرستار انجام می‌گیرد، کدام است؟

- الف) جلوگیری از تضعیف تنفس و بازتاب رفلکس سرفه
- ب) آرام کردن درد بیمار قبل از عمل و شل کردن عضلات
- ج) کم کردن ترشحات تنفسی و درمان برادی کاردی بازتابی
- د) جلوگیری از افزایش فشار خون و اتساع شکم

پاسخ: ج

۲) یکی از مکانیسم‌های جبرانی بدن در مراحل اولیه شوک هیپوولمیک، شیفت مایع از فضای بین سلولی به داخل عروق می‌باشد. پرستار با کدام یک از تظاهرات بالینی زیر می‌تواند پی به وجود این مکانیسم ببرد؟

- الف) لتارژی
- ب) تشنگی
- ج) تهوع
- د) گیجی

پاسخ: ب

۳) جهت بالا بردن اعتماد به نفس فرد مبتلا به بیماری مزمن، کدام روش را پیشنهاد می‌کنید؟

- الف) امیدوار کردن مددجو به بهبودی قطعی
- ب) ایجاد سرگرمی و مشغولیت فکری
- ج) بی‌اهمیت جلوه دادن ناتوانی بیمار
- د) شرکت دادن مددجو در امر مراقبت از خود

پاسخ: د